

ТУБЕРКУЛЕЗ

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ



ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ. ПРИ КАШЛЕ, ЧИХАНИИ, РАЗГОВОРЕ В СОСТАВЕ МЕЛЬЧАЙШИХ ЧАСТИЦ.

КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ. ЧЕРЕЗ ВЕЩИ, С КОТОРЫМИ КОНТАКТИРОВАЛ БОЛЬНОЙ

ПИЩЕВОЙ. ЧЕРЕЗ МОЛОКО БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ, ЯЙЦА.

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ



КАШЕЛЬ. СНАЧАЛА СУХОЙ, ЗАТЕМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ МОКРОТА, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ГНОЙНОЙ, ИНОГДА С ПРОЖИЛКАМИ КРОВИ



КРОВОХАРКАНИЕ (НЕ ВСЕГДА)



МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



БОЛЬ В ГРУДИ, УСИЛИВАЮЩАЯСЯ ПРИ ДЫХАНИИ



ОДЫШКА



ЛИХОРАДКА



СЛАБОСТЬ



НОЧНАЯ ПОТЛИВОСТЬ



ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОХУДЕНИЕ



ПОТЕРЯ АППЕТИТА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ (НАЗ-7 ДЕНЬ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ)

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ: РЕАКЦИЯ МАНТУ – ДЕТЯМ ЕЖЕГОДНО;
ФЛЮОРОГРАФИЯ – ВЗРОСЛЫМ ЕЖЕГОДНО

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНТАКТИРОВАВШИМИ ЛИЦАМИ

ОТКАЗ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

БОРЬБА СО СТРЕССАМИ

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГЕНЫ

ПРОФИЛАКТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА